

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
18 iulie 2018

Probă scrisă
Veterinar
Profesori

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Varianta 2

- **Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.**
- **Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.**
- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.**

SUBIECTUL I

(60 de puncte)

I.1. 19 puncte

a. 2 puncte

Ascita fetală reprezintă acumularea exagerată de lichide în cavitatea abdominală și uneori chiar și în cavitatea toracică a fătului.

Pentru răspuns corect se acordă **2 puncte**.

Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă **1 punct**.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, **0 puncte**.

b. 6 puncte

- dorso-sacrală;
- dorso-pubienă;
- dorso-iliacă stângă;
- dorso-iliacă dreaptă;
- dorso-suscotiloidienă stângă;
- dorso-suscotiloidienă dreaptă.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte **1 punct (6x1p=6 puncte)**.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, **0 puncte**.

c. 5 puncte

- frânghiute obstetricale;
- purtătorul de frânghiută;
- cârlige obstetricale;
- fetotomul curb de deget;
- fetotomul butonat De Bruin;
- fetotomul ferăstrău de sârmă Thygessen;
- respingătorul cu crăcan;
- spatule obstetricale;
- rahioforul Stuwen;

Pentru oricare cinci răspunsuri corecte se acordă câte **1 punct (5x1p=5 puncte)**.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, **0 puncte**.

d. 6 puncte

- la inspecție se observă că parturiția întârzie, desi femela face eforturi de expulzare;
- la explorația vaginală manuală se constată că cervixul este întredeschis, dar nu este șters, iar fătul nu este angajat;
- uneori, la explorația vaginală manuală cervixul apare ca un inel ce nu mai poate fi dilatat;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte **2 puncte (3x2p=6 puncte)**.

Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă **1 punct. (3x1p=3 puncte)**.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, **0 puncte**.

I.2. 19 puncte

a. 3 puncte

- vârsta tânără sau înaintată
- stresul
- tulburări respiratorii cronice
- carențele

Pentru oricare trei răspunsuri corecte se acordă câte **1 punct (3x1p=3 puncte)**.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, **0 puncte**.

b. 6 puncte

Se administrează:

- antiinfecțioase
- ser antigangrenos
- antitoxice
- stimulante generale
- tonice cardiace
- glucocorticoizi

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte **1 punct (6x1p=6 puncte)**.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, **0 puncte**.

c. 10 puncte

Semne clinice:

- inapetență
- tuse
- febră de tip remitent
- congestia mucoaselor
- dispnee gravă
- jetaj mucopurulent, continuu
- durere la palpație
- submatitate la percuție
- murmur vezicular înăspriț sau diminuat
- raluri bronhiale uscate, umede și crepitante.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte **1 punct (10x1p=10 puncte)**.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, **0 puncte**.

I.3. 22 de puncte

a. 10 puncte

- are formă conică, cu baza reprezentată de diafragmă orientată caudal și aplatizată lateral.
- de partea mediană a peretelui dorsal și ventral și fața cranială a diafragmei se prinde mediastinul.
- în porțiunea cranială a mediastinului se găsesc: esofagul, traheea, vase, nervi și timusul la tineret
- în porțiunea mijlocie a mediastinului se găsesc: pericardul și inima, esofagul, vase și nervi.
- în porțiunea caudală a mediastinului se găsesc: esofagul, vase și nervi.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte **2 puncte (5x2p=10 puncte)**.

Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă **1 punct. (5x1p=5 puncte)**.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, **0 puncte**.

b. 6 puncte

- cavități nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii și plămâni.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte **1 punct (6x1p=6 puncte)**.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, **0 puncte**.

c. 6 puncte

- în fiecare cavitate nazală se găsesc doi corneți nazali fixați de peretele lateral, care delimitează patru meaturi: dorsal, mijlociu, ventral și comun.
- meatul ventral comunică în partea posterioară, prin choane, cu faringele.
- cavitățile nazale comunică dorsal și lateral cu sinusurile paranasale din oasele maxilare, frontale, zigomatice, etmoid și sfenoid.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte **2 puncte (3x2p=6 puncte)**.

Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă **1 punct. (3x1p=3 puncte)**.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, **0 puncte**.

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

II.1. 20 de puncte

a. 4 puncte

Pentru precizarea categoriei din care fac parte itemii cu alegere duală se acordă **4 puncte**.

b. 8 puncte

Pentru menționarea a două avantaje se acordă câte **2 puncte**. **2x2p=4 puncte**

Pentru menționarea a două dezavantaje se acordă câte **2 puncte**. **2x2p=4 puncte**

c. 8 puncte

Pentru precizarea oricăror două reguli de proiectare ale itemilor cu alegere duală se acordă câte **4 puncte**.
2x4p=8 puncte

II.2. 10 puncte

Pentru argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – **10 puncte**/
argumentare neconvingătoare, superficială – **5 puncte**.